

K

Kaieda R, Todd MM, Cook LN, Warner DS

Acute effects of changing plasma osmolality and colloid oncotic pressure on the formation of brain edema after cryogenic injury

Neurosurg 1989; 24: 671 - 678

Kettler D, Sonntag H

Apnoische Oxygenation unter Verwendung von Trispuffer während Bronchographie

Anaesthesist 1971; 20: 94 - 98

[Klippe HJ, Adams HA, Baumann G, Cascorbi I, Emmel M, Fischer D, Flohé S, Fries D, Gänsslen A, Geiger S, Heller AR, Hildebrand F, Klar E, Lampl L, Prange H, Rolle U, Sarrafzadeh A, Scharf RE, Standl T, Teske W, Werner G, Zander R](#)

Sektion Schock der DIVI: Hämostase im Schock. Teil 1: Historische Aspekte

© Anästhesiologie und Intensivmedizin 2014; 55: 181 - 189

Kochs E

Laktat: Ein Marker für Gewebehypoxie? (Editorial)

Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1999; 34: 224

Kratz CD, Schleppers A, Iber T, Geldner G

Pharmakologische Besonderheiten und Probleme des älteren Patienten

Anaesthesist 2005; 54: 467 - 475

